

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "F.lli Costa Azara" -

Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono - I.T.C. Aritzo - I.T.I. Tonara - I.P.S.S.C.T.A. Desulo Corso IV Novembre 114 - 08038 - **SORGONO** - tel. 0784621001 fax 0784621136 C.Mecc. NUIS01200G - C.F. **81002630911** - P.iva **01106990912**

email: nuis01200g@jec.istruzione.it http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/



Ai Docenti Al Personale ATA

CIRCOLARE N. 139

OGGETTO: Priorità nella vaccinazione del personale scolastico.

Si invia in allegato la nota del Commissario Straordinario F. P. Figliuolo con la quale si dispone che per le categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria (personale scolastico, sanitario, socioassistenziale, difesa, sicurezza e soccorso pubblico) vengano garantite:

- Priorità nella vaccinazione;
- Accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione:
- Predisposizione, ove possibile, di linee dedicate per il ciclo primario sia per il richiamo;

Il personale scolastico potrà, quindi, recarsi presso gli hub vaccinali del territorio e richiedere la somministrazione del vaccino anche senza prenotazione.

Firmata Digitalmente Il Dirigente Scolastico Prof. Luca Tedde



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

Via XX settembre, 11 - 00187 Roma

Roma.

Allegati: 2 (due).

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO"A"

Riferimenti e seguiti in allegato "B".

^^^^^

Annessi://.

- 1. Il Ministero della Salute, con i documenti in riferimento, ha aggiornato progressivamente le raccomandazioni per la somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino, cui hanno fatto seguito comunicazioni attuative a cura di questa Struttura (lettere a seguito). Tali aggiornamenti tengono conto delle evidenze più recenti in tema di risposta immunitaria ai vaccini anti SARS-CoV-2 che mostrano, dopo circa sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, una riduzione progressiva della protezione immunitaria, pur mantenendola elevata nei confronti delle forme severe di malattia.
- 2. Nel dettaglio, le attuali indicazioni ministeriali per la somministrazione delle c.d. "terze dosi" (dosi addizionali e dosi booster) prevedono:
 - nei soggetti trapiantati e immunocompromessi di età ≥12 anni, una dose addizionale¹ di vaccino a mRNA, dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose, come completamento del ciclo di vaccinazione primario;
 - in tutti i soggetti al di sopra dei 40 anni di età a partire dal prossimo 1° dicembre la platea sarà allargata a tutti gli over18²- una dose booster³ di vaccino a mRNA, come richiamo dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, secondo i seguenti intervalli temporali:
 - dopo almeno 150 giorni (cinque mesi) per tutti i soggetti di età ≥18 anni che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione con uno dei vaccini autorizzati da EMA, inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen (cfr. circolari in riferimento i. e j.);
 - dopo almeno 28 giorni ed entro 180 giorni (sei mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario per i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA (cfr. circolare in riferimento g.).

./.

Digitally signed by FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO Date: 2021.11.26 09:44:29 CET

¹ Pari a 30 mcg in 0,3 mL per *Comirnaty* di BioNTech/Pfizer negli *over*-12, 100 mcg in 0,5 mL per *Spikevax* di Moderna negli *over*-18, come da Determina AIFA n. 1067/2021. Non è attualmente autorizzato l'utilizzo di vaccini a vettore adenovirale (VaxZevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) come dose addizionale.

² Con la circolare in riferimento j. l'accesso alla dose booster è stato esteso anche alla fascia 18-39.

³ Nello specifico: 30 mcg in 0,3 mL per *Comirnaty* di BioNTech/Pfizer, 50 mcg in 0,25 mL per *Spikevax* di Moderna in entrambi i casi solo a favore degli *over*-18, come da parere della CTS di AIFA in data 28.10.2021 e successive determine n. 1285/2021 e n. 1352/2021. Non è attualmente autorizzato l'utilizzo di vaccini a vettore adenovirale (VaxZevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) come dose *booster*.

- 3. Per quanto sopra, considerando:
 - la necessità di contenere e contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 attraverso la somministrazione del ciclo primario al maggior numero possibile di soggetti ed il mantenimento di un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati;
 - l'ampliamento progressivo delle platee mensili dei destinatari del booster/richiamo;
 - l'ampia disponibilità di vaccini a mRNA e l'elevata capacità di somministrazione garantita anche dalla riapertura di ulteriori punti vaccinali;
 - la richiamata necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi e di proseguire con il completamento dei cicli vaccinali primari,

vogliano codeste Regioni/P.A.:

- proseguire nella campagna dei cicli vaccinali primari e delle c.d. "terze dosi" sempre nel rispetto delle seguenti priorità:
 - fasce di popolazione più **vulnerabili** rispetto a forme gravi di COVID-19 per età e/o elevata fragilità:
 - categorie per le quali la vaccinazione è **obbligatoria** (personale del comparto sanitario, incluso personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, personale della Scuola, personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, etc.);
 - categorie per le quali la vaccinazione è **fortemente raccomandata**, in particolare familiari conviventi, *caregiver*, genitori/tutori/affidatari dei citati soggetti estremamente vulnerabili;
 - garantire, per le categorie per le quali la <u>vaccinazione è obbligatoria</u>, l'opzione di <u>accesso diretto</u> agli *hub* vaccinali senza prenotazione e predisporre ove possibile <u>linee dedicate</u>, sia per il ciclo primario sia per i richiami. Per tali categorie <u>si autorizza sin d'ora la somministrazione dei richiami a partire dai 18 anni di età</u>, fatto salvo il vincolo temporale dei 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario;
- ricorrere sistematicamente alla "chiamata attiva" per la prenotazione delle c.d. "terze dosi";
- utilizzare entrambi i vaccini a mRNA disponibili in modo bilanciato;
- rafforzare la capillarizzazione delle somministrazioni impiegando medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e team mobili sanitari della difesa.
- 4. L'accelerazione impressa all'attuale fase della campagna di somministrazione dei cicli primari e dei richiami, nel pieno rispetto delle priorità stabilite, consentirà di ridurre ulteriormente il numero di soggetti non ancora vaccinati e di mantenere un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati con il ciclo primario, mitigando così la recrudescenza epidemica, lo sviluppo di ulteriori forme gravi di malattia e di decessi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Generale di Corpo d'Armaia Francesco Paolo FIGLIUOLO

⁴ In particolare: soggetti trapiantati e immunocompromessi, soggetti di età ≥80 anni e, a seguire, della fascia 60÷79, ospiti dei presidi residenziali per anziani, soggetti con elevata fragilità, ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali con disabilità, affetti da disturbi psichiatrici o da dipendenze patologiche, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.